

Pourcentage d'enfants qui ont eu la diarrhée au cours des 2 semaines précédant l'enquête :

Milieu de résidence

- urbain
- rural

Parmi les enfants ayant eu la diarrhée, pourcentage de ceux ayant reçu une TRO :

Milieu de résidence

- urbain
- rural

Parmi les enfants de 0-3 mois, pourcentage :

- non allaités
- allaités exclusivement
- allaités et recevant de l'eau
- allaités plus compléments liquides
- allaités plus complément solides
- utilisant le biberon

Parmi les enfants de 4-6 mois, pourcentage

- non allaités
- allaités exclusivement
- allaités et recevant de l'eau
- allaités plus compléments liquides
- allaités plus complément solides

utilisant le biberon

Mortalité des enfants

Quotient⁷ de mortalité néonatale (/1000)

Quotient⁷ de mortalité infantile (/1000)

Quotient⁷ de mortalité juvénile (/1000)

Quotient⁷ de mortalité infanto-juvénile (/1000)

MST et SIDA

Pourcentage connaissant :

- au moins une MST (SIDA exclu) :
- le SIDA

Pourcentage connaissant le SIDA selon :

Milieu de résidence

- Urbain
- Rural

Niveau d'instruction

- Aucun
- Primaire
- Secondaire et plus

Parmi ceux connaissant le SIDA, pourcentage de ceux ayant cité au moins un mode de transmission :

- Dont :
- Rapports sexuels :
 - Rapports sexuels sans condom :
 - Partenaires sexuel(les) multiples :
 - Rapports sexuels avec prostituées :
 - Transfusion sanguine :
 - Injection :
 - Injections, lames, ciseaux, couteaux :

REPUBLIQUE DU TOGO



1998

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Enquête réalisée par :

Ministère de la Planification et du Développement

Direction de la Statistique

Avec l'assistance technique de :

Demographic and Health Surveys
Macro International Inc.

Enquête financée par :

☞ L'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID)

☞ Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)

☞ Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)

☞ Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

PERIODE DE COLLECTE DES DONNEES

Février à mai

ECHANTILLON

Nombre de grappes tirées :	288
Mébages enquêtés avec succès :	7 517
Taux de réponse des ménages (en %) :	98,6
Femmes de 15-49 ans enquêtées avec succès:	8 569
Taux de réponse des femmes (en %) :	95,6
Homme de 15-59 ans enquêtées avec succès :	3 819
Taux de réponse des homme (en %) :	93,6

Caractéristiques socio-démographiques des femmes et des hommes enquêtés (en %)

	Femmes 15-49 ans	Homme 15-59 ans
Région		
- Lomé		
- Maritime		
- Plateaux		
- Centrale		
- Kara		
- Savanes		
Milieu de résidence		
- Urbain		
- Rural		
Niveau d'instruction		
- Aucun		
- Primaire		
- Secondaire		
- Supérieur		
Etat matrimonial		
- En union		
- Veuf(ve)		
- Divorcé(e)/Séparé(e)		
- Célibataire		

Fécondité

Indice Synthétique de Fécondité (enfants par femme) :

Région	
- Lomé	
- Maritime	
- Plateaux	
- Centrale	
- Kara	
- Savanes	
Milieu de résidence	
- Urbain	
- Rural	
Niveau d'Instruction	
- Aucun	
- Primaire	
- Secondaire et plus	

**Planification
Familiale**

	Femmes en union	Hommes en union
Pourcentage qui connaît : au moins une méthode contraceptive Au moins une méthode moderne Pourcentage qui utilise actuellement : Don't - une méthode trad./pop - une méthode moderne - don't : - Pilule - Stérilet - Condom - Stérilis. Fémin - Autres modernes Utilisation des méthodes modernes selon le milieu de résidence - Urbain - Rural Selon le niveau d'instruction - Aucun - Primaire - Secondaire et plus		

Préférences en matière de fécondité

	Femmes en union	Hommes en union
Pourcentage qui : - ne veut plus d'enfant - veut retarder au moins 2 ans la prochaine naissance		

Santé de la mère et de l'enfant

Pourcentage d'enfants don't la mère a: - reçu une vaccination antitétanique pendant la grossesse (au moins une dose) : - urbain - Rural - eu au moins une visite prénatale auprès d'un professionnel de la santé - urbain - Rural - été assistée à l'accouchement par un professionnel de la santé - urbain - rural	
Pourcentage d'enfants de 12-23 mois pour lesquels la mère a montré la carte de vaccination de l'enfant	
Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu les vaccinations suivantes - BCG - Polio 0 - Polio (3 doses) - DTCoq (3 doses) - Rougeole - Fièvre jaune - Aucune vaccination - Complètement vaccinés	
Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés selon : • Milieu de résidence - Urbain - Rural	
Niveau d'instruction de la mère - Aucun - Primaire - Secondaire et plus -	